

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA NO CÂNCER AVANÇADO DA MAMA

Complementação do artigo publicado na
Acta Oncológica Brasileira 1:37-43, 1977.

Um projeto do programa de oncologia clínica da União Internacional Contra o Câncer, Genebra, Suíça.

Membros da equipe do projeto:

- J.L. Hayward (Diretor) e R.D. Rubens (Secretário) —

Imperial Cancer Research Fund, Breast Cancer Unit, Guy's Hospital, London.

- P.P. Carbone.

Division of Clinical Oncology, Wisconsin Cancer Clinical Center, University Hospital, Madison, USA.

- J.C. Heuson

Institut Jules Bordet, Centre des Tumeurs de L'Université Libre de Bruxelles, Belgium.

- S. Kumaoka

National Cancer Center Hospital, Tokyo, Japan.

A. Segaloff

Richard W. Freeman Research Institute, Alton Ochsner Medical Foundation, New Orleans, USA.

Em 1977 um projeto do programa oncologia clínica da UICC publicou

algumas regras recomendadas para o uso em ensaios clínicos, destinados a avaliar a resposta objetiva ao tratamento de tumor de mama localmente avançado ou metastático.

Desde então ficou aparente que as regras que definiram a duração da remissão não ficaram muito claras. Em particular, no caso de pacientes que obtiveram uma regressão objetiva completa, podem ter tido somente um período de remissão parcial. A seguinte emenda à publicação original, parece necessária.

CATEGORIAS DE RESPOSTAS

- I) Resposta Completa — O desaparecimento de todas as lesões, determinado por duas observações com quatro semanas, pelo menos, de intervalo entre elas.
- II) Resposta Parcial — Cinquenta por cento ou mais de diminuição na medida das lesões mensuráveis, melhora inequívoca na avaliação das lesões não mensuráveis e sem aparecimento de novas lesões, determinado por duas observações com quatro semanas pelo menos de intervalo entre elas.

Doença estacionária ou em progressão:

Estas categorias permanecem como descrito no trabalho original.

DURAÇÃO DA RESPOSTA

Recomenda-se que:

I — O período de resposta global vá da data do início do tratamento à data da primeira observação de progressão da doença.

II — O período de resposta completa vá da data em que a resposta completa for registrada pela primeira vez, à data da primeira observação de progressão da doença.

III — Naqueles pacientes que obtiveram uma resposta parcial, somente o período de resposta global deverá ser registrado.

Assim, em pacientes que obtiveram uma remissão objetiva completa, a duração desta resposta completa deverá ser diferenciada de resposta global mais longa registrada nestes casos.

REFERÊNCIA

Hayward, J.L., Carbonè, P.P., Heuson, J.-C., Kumaoka, S., Segaloff, A., Rubens, R.D.

Assessment of Response to Therapy in Advanced Breast Cancer.

A project of the Programme on Clinical Oncology of the International Union Against Cancer, Geneva, Switzerland.

1. European Journal of Cancer 13, 89-94, 1977.
2. British journal of Cancer 35, 292-298, 1977.
3. Cancer 39, 1289-1298, 1977.
4. Japanese Journal of Cancer Clinics 23, 80-97, 1977.
5. Acta Oncológica Brasileira, 1, 37-43, 1977.
6. Turkish Journal of Cancer 7, 1-11, 1977.